

1. PRODUCTIE SI TARA DE ORIGINE.

Sustainable Agro Solutions S.A.

Ctra. N-240 km 110

25100 Almacelles (Lleida)

SPAIN

Produs in Spain



2. ANALIZE GARANTATE

Analize garantate	%w/w ¹	% w/v
Bor (B) solubil in apa	10,4	13,93

3. NUMELE MARCII.

codabor

FERTILIZATOR SOLUTIE CU BOR

FERTILIZATOR CE

4. PROPRIETATI FIZICO-CHIMICE

Aspect	Solutie Transparenta
Stare fizica	Lichid
Culoare	Albastru-verzui
CE (1%) (mS/cm)	--
Densitate (Kg/L)	1,34 ± 0,01
pH	7,5 ± 0,5
Solubilitate	Solubil complet in apa

¹ Uncertainty Limits in Analytical Measurement according to Annex III of Spanish Regulation RD 863/2008

5. PROPRIETATI.

codabor este un chelat lichid de bor cu o concentratie mare (139 g/l) pentru aplicarea foliara sau in sol , in scopul prevenirii sau corectarii deficientelor de bor.

Bor-ul imbunatateste polimerizarea si stabilitatea stagiilor de cultura. Additional borul faciliteaza sintezia zaharului si transportul acestuia, influenteaza cresterea celulara , imbunatatind productia si calitatea culturii.

Se recomanda in special pentru pomi fructiferi, citrice, vita de vie, maslini, floarea soarelui, morcov, telina, spanac, sfecla, conopida, broccoli, rapita, lucerna.

6. UTILIZARE SI METODE DE DOZAJ.

codabor este un produs recomandat special pentru pomi fructiferi, citrice, vita de vie, maslini, floarea soarelui, morcov, telina, spanac, sfecla, conopida, broccoli, rapita, lucerna.etc.

Dozele recomandate pentru irigarea organica sunt :

Aplicatii	Doza	Nr. Tratamente
Fertirigare	1-3 l/ha per aplicatie	Depinde de conditiile de deficienta ale culturii

Dozele pentru aplicarea foliara sunt :

Cultura	Doza (l/ha)		Nr Tratamente
	Mentenananta	Corectie	
Sfecla	1 – 2	2 – 4	De la 8-10 frunze
Floarea soarelui	1 - 2	2 – 4	De la 6-8 cupluri de frunze
Lucerna	1 – 1,5	1,5 – 2	Dupa fiecare taiere
Legume	1 – 1,5	1,5 - 2	2-3 aplicari la fiecare 15 zile
Ornamentale	1 – 1,5	1,5 - 2	2-3 aplicari la fiecare 15 zile
Pomi fructiferi si citrice	1	1,5	Pre-inflorire
	1	1,5	Caderea petalelor
	1	1,5	Marimea fructului cat o nuca
	1	1,5	Ingrasarea fructului
Maslin	1 – 1,5	1,5 – 2	Perforatie
	1 – 1,5	1,5 – 2	Toamna
Vita de vie	1	1 – 1,5	2-3 aplicari pe ciclu
Capsuni	1	1 – 1,5	2-3 aplicari pe ciclu

Tratament pe frunze uscate; 2-3 ore fara ploaie sunt necesare pentru eficienta tratamentului . A se evita tratamentul pe perioada temperaturilor inalte. Folositi un volum de apa minim de 600l/ha la legume si 1000l/ha in cazul pomilor fructiferi si citrice.

7. OBSERVATII.

codabor este un complex lichid care nu necesita conditii speciale de transport si depozitare. Nu este subiect in consideratii toxicologice.

Este recomandat sa se utilizeze produsul numai sub consultatie tehnico- agronomica.

Temperatura optima de depozitare este intre: 5-30°C. Se mentine in locuri racoroase si uscate.

Este recomandat sa se realizeze inainte de utilizare un test de compatibilitate intre produsele care se aplica.

Sa nu se depoziteze in inaltime mai mult de 3 pachete (saci) sau 5 cutii (bidoane).

Inainte de utilizare cititi cu atentie aceasta eticheta.

S2: A nu se lasa la indemana copiilor.

S13: A nu se depozita in apropierea alimentelor, bauturilor sau a hranei pentru animale.



Acest produs este calificat pentru a fi utilizat in Agricultura Ecologica. Confiirmarea compatibilitatii este emisa de BCS ÖKO Garantie according to UE regulations UE 889/2008, Annex I (European Union) and USDA-NOP Final Rule (EEUU).