

1. PRODUCTIE SI TARA DE ORIGINE.

Sustainable Agro Solutions S.A.

Ctra. N-240 km 110

25100 Almacelles (Lleida)

SPAIN

Produs in Spain



2. ANALIZE GARANTATE

Analize garantate	%w/w ¹	% w/v
Total Azot (N)	14,0	17,01
Pentoxid de fosfor (P ₂ O ₅) solubil in apa	6,0	7,29
Oxid de Potasiu (K ₂ O) solubil in apa	5,0	6,07
Cupru (Cu) chelat si solubil in apa	0,05	0,06
Fier (Fe) chelat si solubil in apa	0,10	0,12
Mangan (Mn) chelat si solubil in apa	0,05	0,06
Molibden (Mo) solubil in apa	0,001	0,00
Zinc (Zn) chelat si solubil in apa	0,05	0,06

*Agent de chelare: EDTA

3. NUMELE MARCII.

codafol 14-6-5

NPK 14-6-5 FERTILIZATOR CU MICROELEMENTE

4. PROPRIETATI FIZICO-CHIMICE.

Aspect	Solutie transparenta
Stare fizica	Lichid
Culoare	Verde
CE (1%) (mS/cm)	--
Densitate (Kg/L)	1,21 ± 0,01

¹ Uncertainty Limits in Analytical Measurement according to Annex III of Spanish Regulation RD 863/2008

pH	6,0 ± 0,5
Solubilitate	Complet solubil in apa

5. PROPRIETATI.

codafol 14-6-5 este un fertilizator NPK cu o inalta concentratie de azot, special indicat pentru culturile aflate in primele stagii de dezvoltare.

codafol 14-6-5 este special recomandat pentru aplicarea foliara pentru o asimilare rapida.

Este special indicat pentru cereale, culturi de legume, pomi fructiferi, citrice, maslini, ornamentale, etc.

6. UTILIZARE SI METODE DE DOZAJ.

codafol 14-6-5 poate fi aplicat de la dezvoltarea primelor Frunze pana la stadiul din inaintea infloririi.

Dupa inflorire tratamentul poate incepe din nou, repetandu-se pana la maturare, in functie de nevoile culturii.

In perioadele de crestere active , se recomanda aplicarea la aproximativ 15 zile.

Cultura	Doza media
Pomi fructiferi, citrice	200-250 cc/HI
Maslini	250-300 cc/HI
Legume	150-250 cc/HI
Ornamentale	150-250 cc/HI
Cereale	300-500 cc/HI
Crese	200-300 cc/HI
Terenuri de golf , peluza	300-500 cc/HI

7. OBSERVATII.

Se recomanda a nu se aplica pe perioada temperaturilor inalte, deoarece poate produce arsuri frunzelor in cazul tratamentului foliar.

Este compatibil cu majoritatea produselor fitosanitare. Se recomanda efectuarea in prealabil a unui test de compatibilitate.

Complex lichid care nu necesita conditii special de de transport si depozitare. Nu este subiect in consideratii toxicologice.

Este recomandat sa se utilizeze produsul numai sub consultatie tehnico- agronomica.

Temperatura optima de depozitare este intre: 5-30°C. Se mentine in locuri racoroase si uscate.

A nu se depozita mai mult de 3 pachete in inaltime.

Inainte de utilizare cititi cu atentie aceasta eticheta.

S2: A nu se lasa la indemana copiilor.

S13: A nu se depozita in apropierea alimentelor, bauturilor sau a hranei pentru animale.

In caz de ingerare accidentala sau va simtiti rau, solicitati sfatul medicului (aratati eticheta daca este posibil)