

1. PRODUCTIE SI TARA DE ORIGINE.

Sustainable Agro Solutions S.A.

Ctra. N-240 km 110

25100 Almacelles (Lleida)

SPAIN

Produs in Spania



2. ANALIZE GARANTATE.

Analize garantate	%w/w ¹	% w/v
Total Azot (N)	3,4	4,11
Amino-acizi liberi	12,9	15,60
Fier (Fe) solubil in apa	2,0	2,42
Mangan (Mn) solubil in apa	0,6	0,72
Zinc (Zn) complex si solubil in apa	0,4	0,48
Agent complexare: Amino acizi liberi.		

3. NUMELE MARCII.

codamin 150

AMINOACIZI CU FIER(Fe), MANGAN(Mn) SI ZINC(Zn)

4. PROPRIETATI FIZICO-CHIMICE.

Aspect	Solutie inchisa
Stare fizica	Lichid
Culoare	Maro inchis
CE (1%) (mS/cm)	--
Densitate (Kg/L)	1,21 ± 0,01
pH	4,8 ± 0,5
Solubilitate	Complet solubil in apa

¹ Uncertainty Limits in Analytical Measurement according to Annex III of Spanish Regulation RD 863/2008

5. PROPRIETATI.

codamin 150 este un complex cu urme de elemente, imbogatit cu amino-acizi care actioneaza ca un agent complex asupra efectului de asimilare a plantei, atat prin aplicare foliara cat si prin aplicare la radacina.

Amino-acizii stimuleaza functiile fiziologice ale culturii: germinare, inflorire, polinerizare, setarea si dezvoltarea fructului.

codamin 150 stimuleaza si creste rezistenta plantelor la conditii adverse: stresul hidric, inghet, atacurile criptogramice, etc.

Combinatia de elemente (fier, mangan si zinc) cu amino-acizi furnizeaza plantei capacitatea de a sintetiza mai cu multa rapiditate proteinele necesare, evitand procesul metabolic propriu de sintetizare a proteinelor, salvand astfel energie.

6. METODE DE UTILIZARE SI DOZAJ.

codamin 150 este recomandat pentru toate tipurile de cultura, atat prin aplicare foliara cat si la radacina.

Stagiile recomandate de aplicare sunt:

- Culturi arboricole: Pre-inflorire – Stabilitatea si dezvoltarea fructului.
- Culturi joase: Se incepe in primele stadii ale culturii si se repeta cate una pana la trei aplicatii (la fiecare 20 de zile).

Aplicare foliara	DOZA codamin 150
Culturi arboricole	200 – 300 cc/Hl
Culturi joase	150 – 300 cc/Hl
Foliar adjuvant	100 – 200 cc/Hl

Aplicare la radacina codamin 150	Observatii
3 – 5 l/ha pe aplicare	4 la 8 aplicari pe ciclu

7. OBSERVATII.

codamin 150 nu este un produs periculos, nu necesita conditii special de de transport si depozitare. Nu este subiect in consideratii toxicologice.

Este recomandat sa se utilizeze produsul numai sub consultatie tehnico- agronomica.

Temperatura optima de depozitare este intre: 5-30°C. Se mentine in locuri racoroase si uscate.

Sa nu se depoziteze in inaltime mai mult de 5 cutii

Inainte de utilizare cititi cu atentie aceasta eticheta.

S2: A nu se lasa la indemana copiilor.

S13: A nu se depozita in apropierea alimentelor, bauturilor sau a hranei pentru animale.

In caz de ingerare accidentala sau va simtiti rau, solicitati sfatul medicului (aratati eticheta daca este posibil)