

1. MANUFACTURER AND COUNTRY OF ORIGIN.
Sustainable Agro Solutions S.A.

Ctra. N-240 km 110

25100 Almacelles (Lleida)

SPAIN

Manufactured in Spain


2. ANALIZE GARANTATE.

Analiza garantata	%w/w ¹	% w/v
Total nitrogen (N)	7,20	8,06
Aminoacizi liberi	9,00	10,08

3. NUMELE PRODUSULUI (MARCII).
codasting

AMINO ACIZI

4. PROPRIETATI FIZICO-CHIMICE.

Aspect	Solutie inchisa
Stare fizica	Lichid
Culoare	Maro inchis
CE (1%) (mS/cm)	--
Densitate (Kg/L)	1,12 ± 0,01
pH	5,5 ± 0,5
Solubilitate	Complet solubil in apa

¹ Uncertainty Limits in Analytical Measurement according to Annex III of Spanish Regulation RD 863/2008

5. PROPRIETATI.

codasting este un fertilizant special pentru aplicare foliara sau la radacina cu o mare putere de penetrare si effect rapid. Sinergia intre Nitrogen, amino-acid si adjuvantii speciali promoveaza acest effect asupra plantei.

Cele mai importante efecte ale produsului sunt:

- Cresterea masei radacinilor si dezvoltarea vegetativa
- Stimularea in floririi
- Cresterea calitatii fructelor (greutate,culoare si continut de zahar).
- Cresterea rezistentei in conditii de stress (schimbari bruste de temperatura)

6. METODE DE UTILIZARE SI DOZAJ.

codasting este un produs lichid complet solubil in apa, recomandat tuturor tipurilor de cultura.

codasting poate fi utilizat foliar sau aplicat la radacina.

Dozele recomandate sunt:

UTILIZARE IN FERTIRIGARE		
Doza	Nr Aplicatii	Observatii
1 – 2 l/ha	3 – 4 (la intervale de 20 zile)	1 st aplicare: Inceputul in floririi 2 nd aplicare: Formarea fructului 3 rd aplicare: Dezvoltarea fructului

APLICARE FOLIARA			
Cultura	Doza	Nr Utilizari	Observatii
LEGUME Rosii, Ardei, Pepene, Vinete, Dovlecei, Tomato, ..	100 – 150 cc/Hl	2 – 4	Prima aplicare: In stadiul de prein florire sau 4-6 frunze Rest: la interval de 15-20 zile
POMI FRUCTIFERI Par , Mar, Piersic, Cires....	100 cc/Hl	2 – 3	Prima aplicare: la caderea petalelor Rest: la interval de 15-20 zile.
CITRICE Portocal, Mandarin, Lamai,	100 cc/Hl	2 – 3	Prima aplicare: Primavara la preinmugurire. A 2-a aplicare: Caderea petalelor. A 3-a aplicare: Cresterea fructului.
CAPSUNI	100 cc/Hl	3 – 4	Prima aplicare: Prein florire. Rest: la interval de 20 zile.
CARTOFI	100 cc/Hl	3	Prima aplicare: Stadiu de 4-6 frunze. Rest: la interval de 20 zile.
NAUT	100 cc/Hl	3	Prima aplicare: Stadiu de 4-6 frunze. Rest: la interval de 20 zile.
VITA DE VIE	75 - 100 cc/Hl	2	Prima aplicare: Prein florire.. A 2-a aplicare: Post- in florire.

APLICARE FOLIARA			
ARBORI MEDII	100 cc/Hl	3	Prima aplicare: Preinflorire. A 2-a aplicare: Post- inflorire.. A 3-a aplicare: Inainte de coacere
AVOCADO,	100 cc/Hl	2	Prima aplicare: Preinflorire. A 2-a aplicare: Post- inflorire.
MASLIN	75 - 100 cc/Hl	2	1 st application: Initiation of flowering. 2 nd application: post inflorire
BUMBAC, FLOAREA SOARELUI	1 l/ha	2	Prima aplicare: Preinflorire. A 2-a aplicare: dupa 20-30 zile.
SFECLA	1 l/ha	1	Cand planta are 6-10 frunze.

In sere se recomanda utilizarea unor dozaje mai mari.

7. OBSERVATII.

codasting poate fi mixat cu chimicale agricole normale cu o singura exceptie pentru cele care au reactii alkaline.Este recomandat sa se realizeze inainte un test de compatibilitate.

Sunt recomandate pentru uz general, este recomandat sa se utilizeze sub consultanta tehnico-agronomica.

Se depoziteaza la temperaturi optime intre 5-30° C.

Nu se suprapun mai mult de 5 cutii in inaltime.

S2: A nu se lasa la indemana copiilor.

S13: A nu se depozita in apropierea alimentelor, bauturilor sau a hranei pentru animale.