

1. PRODUCTIE SI TARA DE ORIGINE.
Sustainable Agro Solutions S.A.

Ctra. N-240 km 110

25100 Almacelles (Lleida)

SPAIN

Produs in Spain


2. ANALIZE GARANTATE

Analize garantate	%w/w ¹	% w/v
Total Nitrogen (N)	1,3	1,45
Amino-acizi liberi	6,0	6,72

Contine 224 g/l extract de alge.

3. NUME COMERCIAL
dalgin

AMINO ACIZI

4. PROPRIETATI FIZICO-CHIMICE

Aspect	Solutie inchisa
Stare fizica	Lichid
Culoare	Negru
CE (1%) (mS/cm)	--
Densitate (Kg/L)	1,12 ± 0,01
pH	8,5 ± 0,5
Solubilitate	Complet solubil in apa

¹ Uncertainty Limits in Analytical Measurement according to Annex III of Spanish Regulation RD 863/2008

5. PROPRIETATI.

Dalgin este un produs cu aminoacizi si extract de alge marine (*Ascophyllum nodosum*) .

Particularitatea algei marine este rezerva naturala de micro si macro nutrient, aminoacizi si carbohidrati, care maresc randamentul culturii, calitatea si vigoarea acesteia. **dalgin include cresterea naturala natural growth promoters such as occurring cytokinins, auxins and gibberellins.**

6. MODUL DE APLICARE SI DOZAJ.

dalgin este recomandat special pentru aplicarea foliara, dar poate fi utilizat si in cazul fert-irigarii.

Pentru performanta optima a produsului, va recomandam distributia pulverizarii prin cresterea frecventei de aplicare.

In cazul aplicarii foliare, va recomandam sa folositi o doza mai mare cand se doreste dezvoltarea frunzisului culturii.

Aplicare foliara:

CULTURA	DOZAJ	UTILIZARE
Arbori fructiferi si citrice	200 – 250 cc/Hl	In preinflorire, la caderea petalelor si cresterea fructelor
Masline	200 – 250 cc/Hl	1 sau 2 tratamente in primavara si 1 in toamna.
Struguri	200 – 250 cc/Hl	Start in pre-inflorire si aplicati de 2-3 ori in perioada ciclului culturii.
Culturi Horticole	200 – 250 cc/Hl	Se porneste de la stadiul de 4 la 6 frunze si se continua aplicarea la fiecare 2 saptamani
Porumb	1 l/ha	Prima data se aplica la stadiul de 4 pana la 6 frunze, a doua oara se aplica la inaltimea de 50-75 cm.
Cereale	1 l/ha	Tratamentul se aplica in conjunctie cu ierbicidarea.
Cartof	2 l/ha	Se incepe in tuberculul emergent si se continua la fiecare 15 zile.

Dozajele recomandate sunt aproximative, acestea mai pot fi ajustate in functie de regiunea climatica, sol si tipul de fertilizare.

Aplicatie in fert-irigare (irigare drip):

Se aplica 3 to 4 l/ha dupa transplantare sau in stadiul de 4-6 frunze. Se repeat dupa 1 sau 2 saptamani.

7. OBSERVATII.

dalgin este un produs agricol care nu necesita conditii special de de transport si depozitare. Nu este subiect in consideratii toxicologice.

Este recomandat sa se utilizeze produsul numai sub consultatie tehnico- agronomica.

Temperatura optima de depozitare este intre: 5-30°C. Se mentine in locuri racoroase si uscate.

dalgin este compatibil cu majoritatea pesticidelor. Este recomandat sa se realizeze inainte de utilizare un test de compatibilitate intre produsele care se aplica.

Sa nu se depoziteze in inaltime mai mult de 3 pachete (saci) sau 5 cutii (bidoane).

Inainte de utilizare a se citi cu atentie aceasta eticheta.

S2: A nu se lasa la indemana copiilor.

S13: A nu se depozita in apropierea alimentelor, bauturilor sau a hranei pentru animale.