

1. PRODUCTIE SI TARA DE ORIGINE.

Sustainable Agro Solutions S.A.

Ctra. N-240 km 110

25100 Almacelles (Lleida)

SPAIN

Produs in Spania



2. ANALIZE GARANTATE

Analize garantate	%w/w ¹	% w/v
Acid alginic	1,5	1,63
Manitol	0,5	0,54
Oxid de potasiu (K ₂ O) solubil in apa	3,3	3,59

3. NUMELE MARCII.

e-dalgin

EXTRACT DE ALGE MARINE

4. PROPRIETATI FIZICO-CHIMICE.

Aspect	Solutie inchisa
Stare fizica	Lichid
Culoare	neagra
CE (1%) (mS/cm)	--
Densitate (Kg/L)	1,09 ± 0,01
pH	8,8 ± 0,5
Solubilitate	Complet solubil in apa

5. PROPRIETATI.

e-dalgin este un lichid 100% compus din extract de alge marine (s.m.s.), formulat din alga *Ascophyllum nodosum*.

Compozitia speciala din alga *Ascophyllum nodosum* constituie o rezerva naturala de micro si macronutrienti, aminoacizi si carbohidrati care cresc eficienta culturii, calitatea si vigoarea acesteia.

e-dalgin cuprinde promotori de crestere naturala cum ar fi : cytokinine, auxine si gibberelline.

6. METODE DE UTILIZARE SI DOZAJ.

e-dalgin este un fertilizant special recomandat pentru aplicare foliara, dar poate fi utilizat si in fertirigare.

Pentru o actiune optima a produsului , este recomandat sa se creasca frecventa de aplicare la pulverizare.

In cazul aplicarii foliare se recomanda sa se utilizeze doze mai mari pe masura ce cultura dezvolta frunzisuri mai mari.

Aplicare Foliara:

CULTURA	DOZA	APLICATII
Arbusti fructiferi si citrice	1,5 – 2 l/ha (200 – 250 cc/Hl)	In preinflorire, la caderea petalelor si la dezvoltarea fructului
Maslin	1,5 – 2 l/ha (200 – 250 cc/Hl)	1 sau 2 tratamente in primavara si 1 in toamna.
Butuci vita de vie	1,5 – 2 l/ha (200 – 250 cc/Hl)	Initial in preinflorire si se realizeaza 2 sau 3 aplicatii pe perioada ciclului culturii.
Legume	1 – 2 l/ha (200 – 250 cc/Hl)	Initial in stadiul de 4 - 6 frunze si se continua la fiecare 2 saptamani.
Porumb	1 l/ha	Initial in stadiul de 4 - 6 frunze A2-a oara la inaltimea de 50-75 cm.
Cereale	1 l/ha	Aplicati tratamentul odata cu erbicidele.
Cartofi	2 l/ha	Initiati la aparitia tubercuilor si apoi continuati la fiecare 15 zile

Dozele recomandate sunt aproximative, acestea pot varia in functie de regiunea climatica, tipul solului si fertilitatea acestuia.

Fert-irigare :

Aplicati 3 - 4 l/ha pe utilizare dupa transplantare sau in stadiul de 4-6 frunze. Repetati aplicarea dupa 1 sau 2 saptamani.

7. OBSERVATII.

e-dalgin este un produs agricol, nu este un produs periculos, nu necesita conditii special de de transport si depozitare. Nu este subiect in consideratii toxicologice.

Este recomandat sa se utilizeze produsul numai sub consultatie tehnico- agronomica.

Temperatura optima de depozitare este intre: 5-30°C. Se mentine in locuri racoroase si uscate.

Sa nu se depoziteze in inaltime mai mult de 3 saci sau 5 cutii

Inainte de utilizare cititi cu atentie aceasta eticheta.

S2: A nu se lasa la indemana copiilor.

S13: A nu se depozita in apropierea alimentelor, bauturilor sau a hranei pentru animale.



Acest produs este apt pentru a fi utilizat in Agricultura Ecologica. Confirmarea compatibilitatii este emisa de BCS ÖKO Guarantee according to UE regulations UE 889/2008, Annexe I (European Union) and USDA-NOP Final Rule (EEUU).